

22^{pa} Јуниорска македонска математичка олимпијада 2018


Машински факултет-Скопје,
02.06.2018

1. Определи ги сите природни броеви $n > 2$, такви што $n = a^3 + b^3$, каде што a е најмалиот природен делител на n поголем од 1 и b е произволен природен делител на n .

Решение. Прво да забележиме дека ако n е непарен, тогаш мора и двата делители a и b се непарни. Но, нивниот збир е парен, па n мора да биде парен, што е контрадикција. Значи, n е парен и $a = 2$. Тогаш мора и b да биде парен. Важи и дека $b|(n - b^3) = a^3 = 8$. Оттука, добиваме дека $b \in \{2, 4, 8\}$. Значи, бараните броеви n се $n = 16, n = 72, n = 520$.

2. Дадена е полукружница k со центар O и дијаметар AB . Нека C е точката од k таква што $CO \perp AB$. Симетралата на $\angle ABC$ ја сече k во точката D . Нека E е точката од AB таква што $DE \perp AB$ и нека F е средината на CB . Докажи дека четириаголникот $EFCD$ е тетивен.

Решение.



Триаголникот ABC е рамнокрак правоаголен. Нека $CD \cap AB = \{H\}$. Од

$$\angle AED = \angle ADB = 90^\circ \text{ и } \angle DAE = \angle DAB$$

следува дека $\triangle ADE \sim \triangle ABD$. Од тетивноста на четириаголникот $ABCD$ следува

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC = 135^\circ \text{ т.е. } \angle HDA = 45^\circ. \text{ Тогаш}$$

$$\angle DAB = \angle DAC + \angle CAB = \angle DBC + \angle CAB = 22^\circ 30' + 45^\circ = 67^\circ 30'.$$

Според тоа,

$$\angle HAD = 180^\circ - \angle DAB = 180^\circ - 67^\circ 30' = 112^\circ 30',$$

односно

$$\angle AHD = 180^\circ - (\angle HAD + \angle HDA) = 180^\circ - 157^\circ 30' = 22^\circ 30'$$

т.е. $\triangle HDB$ е рамнокрак. Бидејќи $\triangle HDB$ е рамнокрак и $DE \perp AB$ следува дека E е средина на HB . Но, E е средина на HB и F е средина на CB , па затоа EF е средна линија во $\triangle HBC$ т.е. $EF \parallel HC$ т.е. $EF \parallel CD$. Значи, четириаголникот $EFCD$ е трапез.

Понатаму, $EF \parallel HC$ следува $\angle FEB = \angle CHB = 22^\circ 30'$. Од $DE \perp AB$ имаме

$$\angle DEF = 90^\circ - \angle FEB = 90^\circ - 22^\circ 30' = 67^\circ 30'.$$

Според тоа,

$$\angle EFB = 180^\circ - (\angle FEB + \angle EBF) = 180^\circ - 67^\circ 30' = 112^\circ 30' \text{ т.е.}$$

$$\angle CFE = 180^\circ - \angle EFB = 67^\circ 30'.$$

Конечно, $EFCD$ е рамнокрак трапез, од каде следува тврдењето.

3. Нека x, y, z се позитивни реални броеви такви што $x + y + z = 1$. Докажи дека

$$\frac{(x+y)^3}{z} + \frac{(y+z)^3}{x} + \frac{(z+x)^3}{y} + 9xyz \geq 9(xy + yz + zx).$$

Кога важи знак за равенство?

Решение. Имаме

$$\begin{aligned} \frac{(x+y)^3}{z} + \frac{(y+z)^3}{x} + \frac{(z+x)^3}{y} + 9xyz &\geq 3\sqrt[3]{\frac{(x+y)^3}{z} \cdot \frac{(y+z)^3}{x} \cdot \frac{(z+x)^3}{y}} + 9xyz \\ &= 3 \frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{\sqrt[3]{xyz}} + 9xyz \geq 3 \frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{\frac{x+y+z}{3}} + 9xyz \\ &= 9(x+y)(y+z)(z+x) + 9xyz \\ &= 9(x+y+z)(xy+yz+zx) = 9(xy+yz+zx). \end{aligned}$$

Знак за равенство важи ако и само ако $x = y = z = \frac{1}{3}$.

4. Определи ги сите парови (p, q) , $p, q \in \mathbb{N}$ такви што

$$(p+1)^{p-1} + (p-1)^{p+1} = q^q.$$

Решение. Имаме

$$(p+1)^{p-1} + (p-1)^{p+1} \geq (p+1)^{p-1} \geq (p-1)^{p-1} \quad (1)$$

$$(p+1)^{p-1} + (p-1)^{p+1} < (p+1)^{p+1} + (p+1)^{p+1} = 2(p+1)^{p+1} < (p+2)^{p+2} \quad (2)$$

Од (1) и (2) следува дека

$$(p-1)^{p-1} \leq q^q < (p+2)^{p+2}.$$

1) Нека

$$q = p-1, (p+1)^{p-1} + (p-1)^{p+1} = (p-1)^{p-1}.$$

Од

$$(p+1)^{p-1} + (p-1)^{p+1} \geq (p+1)^{p-1} \geq (p-1)^{p-1}$$

имаме $(p-1)^{p+1} = 0$ и $(p+1)^{p-1} = (p-1)^{p-1} \Rightarrow p=1, q=0$. Но 0 не е природен од што следува дека $(p+1)^{p-1} + (p-1)^{p+1} = (p-1)^{p-1}$ нема решение во \mathbb{N} .

2) Нека $q=p$, $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=p^p$.

Ако $p=1$, тогаш

$$(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=1 \text{ и } p^p=1.$$

Значи $(p,q)=(1,1)$ е решение на $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=q^q$.

Ако $p=2$, тогаш

$$(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=4 \text{ и } p^p=4.$$

Значи $(p,q)=(2,2)$ е решение на $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=q^q$.

Ако $p=3$, тогаш

$$(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=32 \text{ а } p^p=27.$$

Значи $(p,q)=(3,3)$ не е решение $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=q^q$.

Ако $p \geq 4$, тогаш важи $(p-1)^p > p^{p-1}$. Добиваме

$$(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1} > (p+1)^{p-1}+p^{p-1}(p-1) > p^{p-1}+p^{p-1}(p-1)=p^p.$$

Значи кога $p \geq 4$, $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=p^p$ нема решение во N .

3) Нека $q=p+1$

$$(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=(p+1)^{p+1} \Leftrightarrow$$

$$(p-1)^{p+1}=(p+1)^{p-1}((p+1)^2-1) \Leftrightarrow$$

$$(p-1)^{p+1}=(p+1)^{p-1}p(p+2)$$

Бидејќи p и $p-1$ се заемно прости $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=(p+1)^{p+1}$ нема решение во N .

Конечно, решенија на $(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=q^q$ се $(p,q)=(1,1)$ и $(p,q)=(2,2)$.

5. Во кружница е впишан правилен 2018-аголник. Броевите $1,2,\dots,2018$ се распоредуваат во темињата на 2018-аголникот, во секое теме по еден број, така што збирот на секои два соседни броја (од тоа распоредување) е еднаков на збирот на двата нивни дијаметрално спротивни броја. Определи го бројот на различните распоредувања на броевите.

(Распоредувањата добиени со ротација околу центарот на кружницата се сметаат за еднакви).

Решение. Разгледуваме распоред на броевите кој го исполнува условот на задачата. Нека A, B се два соседни броја во тој распоред и нивните дијаметрално спротивни броја се a, b соодветно. Тогаш е исполнет условот $A+B=a+b$ или $A-a=b-B$. Од произволноста на соседните броеви A, B добиваме дека било која разлика на броевите на дијаметрално спротививните места е константа, односно $A-a=C$. Значи, броевите од 1 до 2018 треба да се групираат во 1009 парови така што разликата на броевите во секој пар да е C . Вакви парови може да се формираат ако C е делител на 1009.



Нека $C = k$. Тогаш мора (соодветно) броевите да се спаруваат на следниот начин

$$\{1, 2, \dots, k\} \rightarrow \{k+1, k+2, \dots, 2k\}, \{2k+1, 2k+2, \dots, 3k\} \rightarrow \{3k+1, 3k+2, \dots, 4k\}, \dots, \\ \{2019-2k, \dots, 2017-k, 2018-k\} \rightarrow \{2019-k, \dots, 2017, 2018\}. \dots (1)$$

(k елементи од едно множество се спаруваат со k елементи од друго множество, при што секој елемент од множеството $\{1, 2, \dots, 2018\}$ треба да се јави точно еднаш).

Ако бројот на (стрелките) спарувања во (1) е m , тогаш $2018 = 2km$ или $1009 = km$. Бидејќи 1009 е прост број, единствени можни вредности за k се 1 и 1009.

- 1) $C = 1$. Во овој случај спарувањето на броевите ќе биде $(1, 2), (3, 4), \dots, (2017, 2018)$ и броевите од еден пар ќе бидат дијаметрални. Нека на една дијагонала го фиксираме првиот пар $(1, 2)$. Да забележиме дека е потребно да се избере редоследот на броевите помеѓу 1 и 2 во еден правец (на пример во правец на стрелките на часовникот), а останатата половина ќе биде детерминирана од условот на задачата. Бидејќи не се бројат ротациите, соседниот број на бројот 1 (во правец на стрелките на часовникот) може да се избере на 1008 начини, неговиот соседен на 1007 начини итн. Значи броевите може да се распоредат на $1008!$ начини (циклична пермутација на 1009 елементи).
- 2) $C = 1009$. Во овој случај броевите ќе бидат групирани на следниот начин $(1, 1010), (2, 1011), \dots, (1009, 2018)$ $(1, 1010), (2, 1011), \dots, (1009, 2018)$. Распоредувањето на броевите како и во првиот случај може да се направи на $1008!$ начини.

Конечно броевите може да се распоредат на $2 \cdot 1008!$ начини.